

Quo vadis TaTME? ZA

Quo vadis TaTME? PRO

Gregor Norčič*

Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Kirurška klinika, UKC Ljubljana

Gastroenterolog 2021; suplement 2: 58

Ključne besede: transanalna totalna mezorektalna ekscizija, TaTME, rak danke

Key words: transanal total mesorectal excision, TaTME, rectal cancer

IZVLEČEK

Tehnika trans-analne totalne mezorektalne ekscizije (TaTME) je bila uvedena v klinično prakso zaradi težavne izvedbe laparaskopske TME v primeru večjih tumorjev srednje in spodnje tretjine danke in/ali ozke medenice. TaTME je tehnično zahtevna kirurška tehnika z relativno dolgo učno krivuljo. Domnevno višjih incidence lokalnih recidivov raka danke in dehiscenc anastomoze pri TaTME v primerjavi z laparaskopsko TME kot so jih opisovali nekateri avtorji analize izidov zdravljenja iz specializiranih centrov in mednarodnega TaTME registra niso potrdile. Dokončno oceno vloge TaTME bodo podali šele rezultati potekajočih študij. Trenutno se kot njene glavne prednosti zdijo boljša kontrola distalnega resekcijskega roba, natančnejša izvedba TME v primeru tumorjev srednje in spodnje tretjine danke ter transanalna formacija anastomoze s cirkularnim spenjalnikom z eno vrsto sponk.

ABSTRACT

Transanal total mesorectal excision (TaTME) has been introduced to clinical practice due to technical difficulties with laparoscopic TME in case of mid- and low-rectal tumors and/or narrow pelvis. TaTME itself is a technically challenging surgical procedure with a long learning curve. Suspected increased local recurrence rate and anastomotic leak rate compared to laparoscopic TME as observed by some authors have not been confirmed in specialized centers or from International TaTME Registry data. Results of ongoing clinical trials will determine the clinical role of TaTME in the future. Main strengths of TaTME are its good distal resection margin control, better completeness of TME in low lying tumors and transanal anastomotic technique with one stapled line.

*doc. dr. Gregor Norčič, dr. med

Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Kirurška klinika, UKC Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana

E-pošta: gregor.norcic@kclj.si